



**Servizio di Radiologia: Direttore dott. Riccardo Zennari**

Tel. 041 290 6519

fax 041 290 6691

e-mail: radiodiagnostica@ospedalevillasalus.it

## **RACCOMANDAZIONE**

### **PER LA PREVENZIONE DELL'INSUFFICIENZA RENALE IN SEGUITO A SOMMINISTRAZIONE DI M.D.C. IODATO**

Nei pazienti con valore della creatininemia superiore a 1,50 mg/ml si rende opportuno adottare il seguente schema di profilassi onde evitare l'insorgenza di insufficienza renale acuta in seguito a somministrazione di mezzo di contrasto iodato

eseguire profilassi secondo il seguente schema di trattamento:

**IL GIORNO PRECEDENTE E IL GIORNO DELL'ESAME:** idratazione per via orale (almeno 1,5 litri d'acqua) e assunzione di 2 bustine di N-Acetilcisteina (Flumucil bustine 200mg, acquistabile in farmacia senza ricetta medica) 2 bustine alle ore 8,00 e 2 bustine alle ore 20,00 (quindi in totale 8 bustine).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

dichiara di aver eseguito la profilassi indicata.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_