



**Servizio di Radiologia - Direttore dott. Christian Cugini**

**Tel. 041 290 6519 - fax 041 290 6691**

**E-mail: radiodiagnostica@ospedalevillasalus.it**

## **GESTIONE DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONE AVVERSA A MEZZO DI CONTRASTO IODATO/PARAMAGNETICO**

Alla cortese attenzione del Medico Curante

della/del Signora/Signor \_\_\_\_\_

I Pazienti a rischio di reazione avversa a MdC sono identificabili nelle seguenti categorie ([www.sirm.org/download/3584](http://www.sirm.org/download/3584)):

- Pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un'indagine con la medesima classe di MdC da impiegare (per es. a base di gadolinio o di iodio);
- Presenza di asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica;
- Mastocitosi se diagnosticata;
- Pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodi/o di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante).

L'allergia a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti non è da considerarsi fattore di rischio per reazioni da ipersensibilità a MdC. Anche l'allergia ad altre categorie di farmaci non è da considerare un fattore di rischio per tali reazioni.

Un'anamnesi positiva per reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone (Betadine) e iodoformio, non costituisce un fattore di rischio per reazioni a MdC a base di iodio.

Sebbene esistano scarse evidenze cliniche sull'efficacia della premedicazione, nei Pazienti a rischio suggeriamo un trattamento farmacologico preparatorio all'indagine radiologica con uso di MdC iodato/paramagnetico per via endovenosa, allo scopo di ridurre e/o prevenire reazioni allergiche, secondo il seguente schema:

<b><u>13 ore prima</u> dell'esame radiologico</b>	<b>PREDNISONE 50 mg in compresse per os (ad esempio 2 compresse di Deltacortene forte®)</b>
<b><u>7 ore prima</u> dell'esame radiologico</b>	<b>PREDNISONE 50 mg in compresse per os</b>
<b><u>1 ora prima</u> dell'esame radiologico</b>	<b>PREDNISONE 50 mg in compresse per os CETIRIZINA 10 mg 1 compressa per os</b>

E' inoltre utile consigliare al Paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione del MdC per via renale, soprattutto nei casi di insufficienza renale ed epatica.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara di aver eseguito la profilassi indicata.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_